

Operationstid: _____

KONTROLTID: _____



Behandlingen foretages i fuld bedøvelse.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du oplyse, om dit barn lider af astma, sukkersyge, overfølsomhed, tendens til strubehoste, hjertesygdom, blødersygdom, eller om dit barn evt. får medicin. Bliver dit barn syg, dagen før operationen, f.eks. halsbetændelse, diarré, opkastning eller feber, skal du meddele det til klinikken. Barnet må ikke have neglelak på fingrene.

I må tidligst møde op 10 min før aftalt tid, og medbringe max 2 ledsagere



Det er vigtigt, at maven er helt tom for ikke at risikere opkastning under bedøvelsen.

Det er vigtigt, at **børn, der skal i narkose, er fastende i 6 timer før operationstiden.** Dette gælder også **mælkeprodukter og tyggegummi.**

Hvis dit barn ammes, skal det faste i 3 timer for brystmælk.

Hvis modermælkserstatning gives, skal der fastes i 4 timer før mødetidspunkt.

Dit barn må drikke vandtynde væsker indtil 2 timer før operationstid (ex juice, saftevand, vand, sodavandsis), men **ingen mælkeprodukter!**

Video-
information

Scan QR-koden og se en kort video, som informerer om forberedelse inden operationen.



Bedøvelsen:	Foregår med maske, foretaget af en erfaren narkoselæge. I vil være ved siden af jeres barn indtil det sover. Derefter opholder I jer i venteværelset eller på gangen udenfor.
Operationen:	Ved operationen laver man et lille hul i trommehinden, suger alt væske og pus ud fra mellemøret, og indsætter et lille dræn i hullet. Drænet sørger for, at mellemøret bliver ordentligt udluftet, og evt. væske eller pus kan slippe ud gennem drænet i stedet for at trykke og genere.
Efter operationen:	Når barnet er vågnet nok til at trække vejret selv, bliver det kørt ind i opvågningsrummet. Her kan I sidde ved siden af barnet imens det vågner. Der kan være andre børn og voksne tilstede. Der vil være en opvågningssygeplejerske i rummet. Du er velkommen til at medbringe et tæppe eller lignende til at lægge over dit barn, mens det vågner op efter operationen samt bamse, dukke eller lignende. Opvågningen sker hurtigt, men når dit barn har været bedøvet, er det nødvendigt, at det er under opsyn af en voksen person i operationsdøgnet. Hvis der efter operationen skulle opstå besværet vejrtrækning eller andre problemer, kan Øreklubben kontaktes på 97402322 Efter kl. 16.00 henvises til vagtlægen.
Hjemme:	Derhjemme kan der forekomme lidt øresmerter, som kan behandles med en Panodil-tablet/mixtur/stikpille, det kan også godt de første døgn løbe lidt fra øret, men dette er naturligt nok. Inden for de første dage, har I fået en kontroltid for at sikre, at drænene holder sig åbne.
Komplikationer:	Efter drænindlæggelse kan det flyde fra ørerne. Ører med flåd renses med saltvand de første 2 dage. Ved vedvarende flåd dryppes med øredråber. Recepten ligger klar på apoteket. Der skal dryppes i 7 dage, hvorefter man kommer til kontrol.