

Operationstid: _____

KONTROLTID: _____



Behandlingen foretages i fuld bedøvelse.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal du oplyse, om dit barn lider af astma, sukkersyge, overfølsomhed, tendens til strubehoste, hjertesygdom, blødersygdom, eller om dit barn evt. får medicin. Bliver dit barn syg, dagen før operationen, f.eks. halsbetændelse, diarré, opkastning eller feber, skal du meddele det til klinikken. Barnet må ikke have neglelak på fingrene.

I må tidligst møde op 10 min før aftalt tid, og medbringe max 2 ledsagere

Faste:



Det er vigtigt, at maven er helt tom for ikke at risikere opkastning under bedøvelsen.

Det er vigtigt, at **børn, der skal i narkose, er fastende i 6 timer før operationstiden.** Dette gælder også **mælkeprodukter og tyggegummi.**

Hvis dit barn ammes, skal det faste i 3 timer for brystmælk.

Hvis modermælkserstatning gives skal der fastes i 4 timer før mødetidspunkt.

Dit barn må drikke vandtynde væsker indtil 2 timer før operationstid (ex juice, saftevand, vand, sodavandsis), men **ingen mælkeprodukter!**

**Video-
information**

Scan QR-koden og se en kort video, som informerer om forberedelse inden operationen.



Smertestillende

Vægt: _____



1 time før operationen:

Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur _____

Efter operationen:

Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur _____ x _____ dagligt
Samt

Bonyl mixtur _____ ml x 2 dagligt

Bedøvelsen:	Foregår med maske, foretaget af en erfaren narkoselæge. I vil være ved siden af jeres barn indtil det sover. Derefter opholder I jer i venteværelset eller på gangen udenfor.
Operationen:	En del af mandlerne fjernes med et instrument, der via radiofrekvens bølger både fjerner vævet og sørger for, at det ikke bløder. Metoden er meget skånsom imod det omkringliggende væv.
Efter operationen:	Når barnet er vågnet nok til at trække vejret selv, bliver det kørt ind i opvågningsrummet. Her kan I sidde ved siden af barnet, imens det vågner. Der kan være andre børn og voksne tilstede. Der vil være en opvågningssygeplejerske i rummet. Efter reduktion af mandlerne og evt. polypperne kan der forekomme lidt blodtilblandet opspyt, siven fra næsen, barnet kan have kvalme og klage over tørhed og svie i halsen, dette er helt normalt. Barnet vil blive tilset af øre-næse-hals-lægen inden det sendes hjem.
Hjemme:	Barnet har behov for fast smertestillende i form af Paracetamol 4 gange dagligt. Der anbefales også at supplere med mixtur Bonyl 2 gange dagligt. Det første døgn gives primært blød og kold mad. Herefter normal mad. Udover halssmerter kan barnet også klage over smerter i øret. Barnet skal holdes hjemme fra institution de første 4 dage og undgå fysisk anstrengende aktiviteter de første 8-10 dage, for at undgå blødning
Komplikationer:	Blødning og infektion ses sjældent. Hvis der efter operationen skulle opstå komplikationer i form af besværet vejrtrækning, blødning selvom barnet har fået is, eller andre problemer, kan Øreklubben kontaktes på 97402322 - Tryk "4" for akut Efter kl. 16 henvises direkte til øre-næse-hals-lægen, som har opereret dit barn. _____ Dorit Thusholt 2628 0716 _____ Thomas Randrup 2785 8837 Hvis du spytter frisk blod ud, ring 112