

Nr. 3

Vejledning omkring fjernelse af en del af mandlerne og evt. polypper:

Denne vejledning skal ses som et supplement til den instruktion, du allerede har fået af vores personale ved den sidste konsultation inden operationen samt den rapport og instruktion, som du vil få af ørelægen i forbindelse med operationen.

Bedøvelsen:

Foregår med maske, foretaget af en erfaren narkoselæge. I vil være ved siden af jeres barn indtil det sover. Derefter foretrækker vi, at I opholder jer i venteværelset eller på gangen udenfor.

Operationen:

En del af mandlerne fjernes med et instrument, der via radiofrekvens bølger både fjerner vævet og sørger for, at det ikke bløder. Metoden er meget skånsom imod det omkringliggende væv.

Efter operationen:

Når barnet er vågnet nok til at trække vejret selv, bliver det kørt ind i opvågningsrummet. Her kan I sidde ved siden af barnet, hvor der også kan være andre børn og voksne tilstede. Der vil også være en opvågningsssygeplejerske i rummet det meste af tiden.

Efter fjernelse af en del af mandlerne og evt. polypperne kan der forekomme lidt blodtilblandet opspyt og lidt sive fra næsen, dette er normalt. Barnet kan kortvarigt være forkvalmet og klage over lidt tørhed og svie i halsen, dette betyder heller ikke noget.

Barnet vil blive tilset af øre-næse-halslægen inden det sendes hjem.

Hjemme:

Barnet har behov for fast smertestillende i form af Paracetamol 4 gange dagligt. Der anbefales også at supplere med mixtur Bonyl 2 gange dagligt.

Det første døgn gives primært blød, men kold mad. Herefter normal mad.

Udover halssmerter kan barnet også klage over smerter i øret.

Barnet skal holdes hjemme fra institution de første 4 dage og undgå fysisk anstrengende aktiviteter de første 8-10 dage, for at undgå blødning.

Komplikationer:

Blødning og infektion ses sjældent.

OBS: Vend siden med henblik på medicin-ordination

Øreklubnikken

Speciallæger i øre-næse-halssygdomme
Dorit Thusholt & Thomas Skov Randrup

Gartnerivej 5, 7500 Holstebro

Tlf.: 97402322

E-mail: reception@oereklinikken.dk

Husk at hente medicinen før operationen. Recept på medicinen er lagt ud på nettet.

Smertestillende (vægt ____kg)

1 time før operationen:

Der gives Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur _____mg/ml 1 time før operationstidspunktet.

Efter operationen:

Der gives Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur _____mg/ml 4 gange dagligt

Samt

Bonyl Mixtur 1 ml/25mg Naproxen _____ml 2 gange dagligt.

Hvis der efter operationen skulle opstå komplikationer i form af besværet vejrtrækning, blødning selvom barnet har fået is, eller andre problemer, kan Øreklubnikken kontaktes på nedenstående telefonnr.

Efter kl 16 henvises direkte til øre-næse-halslægen, som har opereret dit barn.

Poul Hansen
Speciallæge i anæstesiologi
Tlf. 2674 8626

Øreklubnikken 9740 2322
Efter kl. 11.30 9742 1589

Efter kl. 16.00 øre-næse-halslæge:

_____Dorit Thusholt 2628 0716

_____Thomas Randrup 2785 8837